

# TAUCHUNFALL-MERKBLATT



## Schwere Symptome

Schmerzen  
Schwere Hautsymptome  
Schwindel  
Seh-, Hör- und Sprachprobleme  
Schwerer Erschöpfungszustand

Lähmungen  
Atembeschwerden  
Taubheitsgefühl  
Bewusstseinsstörungen  
Alle Symptome, welche unter Wasser auftreten  
Bewusstlosigkeit  
Übelkeit

## Milde Symptome

Auffällige Müdigkeit  
Hautjucken (=Taucherflöhe)

## Keine Symptome

... allerdings deutliche Missachtung der Dekoregeln oder der Auftauchgeschwindigkeit

1. Bei **Atemstillstand**:  
→ Reanimation starten (30:2)  
(100% O<sub>2</sub>, falls möglich)
  - Bei **Bewusstlosigkeit**:  
→ stabile Seitenlagerung
  - Bei **Bewusstsein**:  
→ falls möglich Rückenlage
2. Sofort 100% O<sub>2</sub>-Gabe
  3. Patient beruhigen



**Notruf absetzen:** 144 Rettung  
112 Euro-Notruf

Zuständige **Druckkammer** kontaktieren:  
LKH Graz +43 316 38 51 28 03 (W, St, K, Ost-Tirol, NÖ, B)  
KH Traunstein +49 861 192 22 (OÖ, S)  
BGU Murnau +49 8841 48 26 86 (T, V)  
KH Überlingen +49 7551 94 77-5401 (Bodensee West)



Bei Unklarheiten und Fragen Taucherhotline (24 h, kostenlos) konsultieren:  
DAN-Hotline (A und D) 00800 326 668 783  
DAN-Hotline (international) +39 06 4211 5685  
Schiffahrtsmed. Inst. d. Marine (Kiel) +49 431 5409 1441

- 100% O<sub>2</sub>-Gabe weiterführen
- Flüssigkeit trinken lassen (0,5-1L, alkohol- und koffeinfrei)
- Patienten vor Auskühlung, bzw. Überhitzung schützen
- Evtl. Landeplatz für Hubschrauber vorbereiten
- Tauchunfall-Dokumentation ausfüllen und mit Logbuch und Tauchcomputer dem Notarzt mitgeben

1. Sofort 100% O<sub>2</sub>-Gabe
2. Patient beruhigen
3. Keine unnötige Anstrengung

1. O<sub>2</sub>-Gabe sinnvoll
2. Flüssigkeit trinken lassen (0,5-1L, alkohol- und koffeinfrei)
3. Patient beruhigen
4. Keine unnötige Anstrengung
5. Mindestens 24h beobachten

Eventuell zuständige Druckkammer/Tauchmediziner kontaktieren  
Bei Zustandsverschlechterung siehe *Milde/Schwere Symptome*

**Keine nasse Rekompensation!**

**Alle Tauchpartner** des Verunfallten müssen ärztlich untersucht werden!

Auch ein ordnungsgemäß durchgeführter Tauchgang kann zu Problemen führen!

Symptome können **auch verspätet** auftreten (> 24h)!