TAUCHUNFALL-MERKBLATT

der Österreichischen Wasserrettung

Aktuelle Version auf http://owr.at/TU
Trotz genauester Recherche kann für die Inhalte keine Haftung übernommen werden

Stand: 09.2026

ÖSTERREICH

Schwere Symptome

Schmerzen
Schwere Hautsymptome
Schwindel
Seh-, Hör- und Sprachprobleme
Schwerer Erschöpfungszustand
Lähmungen
Atembeschwerden
Taubheitsgefühl
Bewusstseinsstörungen
Alle Symptome, welche unter Wasser auftreten
Bewusstlosigkeit
Übelkeit

1. Bei **Atemstillstand**:
   → Reanimation starten (30:2)
   (mit 100% O_2, falls möglich)
   Bei **Bewusstlosigkeit**:
   → stabile Seitenlage
   Bei **Bewusstsein**:
   → Rückenlage, falls möglich
2. Sofort 100% O_2-Gabe
3. Patient:in beruhigen

Notruf absetzen: **144 Rettung**
112 Euro-Notruf

Milde Symptome

Auffällige Müdigkeit
Hautjucken (= Taucherflöhe)

1. Sofort 100% O_2-Gabe
2. Patient:in beruhigen
3. Keine unnötige Anstrengung

Keine Symptome

... allerdings deutliche Missachtung der Dekoregeln oder der Auftauchgeschwindigkeit

1. O_2-Gabe sinnvoll
2. Flüssigkeit trinken lassen (0,5-1L, alkohol- und koffeinfrei)
3. Patient:in beruhigen
4. Keine unnötige Anstrengung
5. Mindestens 24h beobachten

Eventuell zuständige Druckkammer/Tauchmediziner:in kontaktieren
Bei Zustandsverschlechterung siehe *Milde/Schwere Symptome*

Zuständige **Druckkammer** kontaktieren:

LKH Graz	+43 316 38 51 28 03	(für W, St, K, Ost-Tirol, NÖ, B)
DK Salzburg	+43 664 751 760 67	(primär für OÖ, S)
KH Traunstein	+49 861 192 22	(Ersatz für OÖ, S)
BGU Murnau	+49 8841 48 26 86	(für T, V)
KH Überlingen	+49 7551 94 77-5401	(für Bodensee West)

Bei Unklarheiten und Fragen bitte Taucher-Hotline (24/7, kostenlos) anrufen:

DAN-Hotline (Europa) +39 06 4211 5685
Schifffahrtsmed. Institut der Deutschen Marine (Kiel) +49 431 5409 1441

- 100% O_2-Gabe weiterführen
- Flüssigkeit trinken lassen (0,5-1L, alkohol- und koffeinfrei)
- Patient:in vor Auskühlung bzw. Überhitzung schützen
- Evtl. Landeplatz für Hubschrauber vorbereiten
- Tauchunfall-Dokumentation ausfüllen und mit Logbuch und Tauchcomputer dem Notfall-Team mitgeben

Keine nasse Rekompression!

Alle Tauchpartner:innen des/der Verunfallten müssen ärztlich untersucht werden!

Auch ein ordnungsgemäß durchgeführter Tauchgang kann zu Problemen führen!

Symptome können **auch verspätet** auftreten (> 24h)!

Nächste Aktualisierung: 07.2029

M. Hirschbichler, H. Rinösl, D.B. Strickmann